

Praxis für Nuklearmedizin
Doz.Dr.sc.med. Klaus Buchali
Dipl.Med. Thomas Alexander
Schönhauser Allee 82
10439 Berlin
Tel.: 4 44 31 49 / FAX: 4 45 95 22

Praxis für Nuklearmedizin, Schönhauser Allee 82, 10439 Berlin

Praxis

Dr.med. Markus Markiewitz
FA f. Allgemeinmedizin/Rheuma.
Berliner Str. 1

16259 Bad Freienwalde

Berlin, den 09.10.95

Sehr geehrter Herr Kollege,

vielen Dank für die Überweisung Ihres Patienten **Ernst-Wolfgang Schulz**, geb. am **06.10.1944**.

Wir führten am 09.10.95 eine Schilddrüsenszintigraphie (mit ca. 40 MBq Tc^{99m}-Pertechnetat) durch, ferner erfolgte eine Blutabnahme zur Bestimmung der freien SD-Hormone und eine sonographische Zuordnung des szintigraphischen Befundes.

Klinische Angaben: Struma nodosa bds., Z.n. Hyperthyreose. Laufende thyreostatische Therapie. Z.n. Bypass-Op.

Ergebnis:

Szintigraphie: Schilddrüsenuptake: 3,2% (obere Norm). Schilddrüse mit vermehrter Tc-Aufnahme rechts caudal. Die restlichen SD-Anteile zeigen eine eher verminderte Speicherung.

Laborbefunde:


			Normalbereich		
TSH basal	0,3	mE/l	(<	4,00)
fT3	5,6	pmol/l	(3,6	-	7,8)
fT4	11,0	pmol/l	(10	-	25)

Beurteilung: Struma nodosa bds. mit heißem Knoten rechts caudal. Der Knoten links zeigt eine eher verminderte Nuklidanreicherung. Unter thyreostatischer Therapie euthyreote Stoffwechsellage. Empfehle definitive Therapie, am ehesten Op. (wegen des vermindert speichernden Knotens links eingeschränkte Indikation zur Radioiodtherapie).

Mit freundlichen Grüßen


Dipl. Med. Thomas Alexander

SCHULZ, ERNST-WOLF *061044
SD-Szintigramm vom: 09.10.95



Cut(u): 5%

Fläche: 21 cm²

Uptake: 3,24 %

Dr. K. Buchali, Dipl. Med. T. Alexander Schönhauser Allee 82 10439 Berlin
--